

*Sprattæ* aux *Lernæenicus*, Parasites de la *Sardine* et du *Spratt*, puisqu'ils sont quelquefois inexact.

Quand on remarquera que *L. Sardinae* se rencontre parfois aussi sur l'*œil* de la *Sardine*, et qu'alors il se modifie de façon à *simuler* le *L. Sprattæ*, on comprendra tout l'intérêt que présente cette simple réflexion, au point de vue de la *Nomenclature zoologique*.

---

MISSION GÉODÉSIQUE DE L'ÉQUATEUR.  
COLLECTIONS RECUEILLIES PAR M. LE D<sup>r</sup> RIVET.

**Coléoptères. Coccinellides.**

PAR M. LE D<sup>r</sup> A. SICARD.

*SOLANOPHILA FAUSTA* Erichs.

Cette espèce a été redécrite par Crotch sous le nom d'*inconstans*.  
Montagne du Chaud Nanégal, Rio Gallabomba.

Var. BIFASCIATA nov. var.

Taches des élytres élargies en forme de bandes. Cette variété diffère de la variété *blanda* de *Sol. humeralis*, qui a une coloration tout à fait analogue, par la forme de la première bande des élytres qui est échancrée au milieu de sa partie antérieure en arrière du calus.

Elle correspond à la variété  $\beta$  de Crotch. Cet auteur indique en outre des variétés à bandes réduites à deux taches et à taches réunies longitudinalement.

Montagne du Chaud Nanégal, Rio Gallabomba, avec le type, mais paraissant plus commune.

*Solanophila Riveti* nov. sp.

« Oblongo-ovalis nigra, pube aurea vestita. Elytris nigris, fasciis duabus luteis, parallelis, transversis; epipleuris parallelis, antice haud dilatatis; pedibus nigris. » — Long. : 8 à 11 millimètres.

En ovale oblong. Tête noire assez grosse, à ponctuation moyenne, à mandibules saillantes, noires; antennes courtes, rousses, avec les deux premiers et le dernier articles rembrunis; palpes noirs, pubescence rousse. Corselet noir, rectangulaire, plus de deux fois aussi large que long, à côtés largement relevés, non rétréci en avant, à ponctuation simple et dense, à pubescence longue, d'un jaune roux brillant, dirigée en dehors de chaque côté de la ligne médiane. Écusson noir, petit, enfoncé, ponctué. Élytres

plus larges que le corselet à la base, arrondis à l'épaule, élargis jusqu'au cinquième, parallèles de là aux trois quarts de la longueur, puis en ogive large jusqu'à l'extrémité avec un rebord relevé étroit, parallèle, non dilaté aux épaules : ponctuation fine, dense et simple; noirs à très léger reflet verdâtre, avec deux bandes d'un jaune d'ocre ne touchant ni la suture ni le bord externe : la première, étendue du sixième au tiers de la longueur, tout à fait transversale, n'atteignant pas la base du calus en avant, un peu plus large à son extrémité interne qu'à l'externe; la seconde, étendue des trois aux quatre cinquièmes de la longueur, convexe en avant, droite en arrière. généralement plus large à son extrémité interne qu'à l'externe. Élytres à angle apical arrondi, à pubescence d'un jaune roux vif, semblable à celle de la *S. fusco pilosa* Weise.

Dessous noir, mésosternum convexe sur toute sa longueur; abdomen noir, à pubescence d'un gris roussâtre, moins vive que celle du dessus. Pieds noirs, fémurs ponctués, pubescents de roux.

Cette espèce se distingue des variétés à deux bandes de *humeralis* Latr. par sa forme plus parallèle, moins convexe, le repli non dilaté aux épaules, la convexité du mésosternum qui, chez *humeralis*, est plus marquée dans la moitié postérieure, et surtout par la couleur de sa pubescence.

Montagne du Chaud Nanégal : Rio Gallabomba.

#### **Diomus ecuadoricus** nov. sp.

«Subrotundatus, convexus, fulvus, pube supra grisea subtus nigra tenue vestitus; meso et metasterno leviter in medio brunnescentibus; mandibulis nigris; pedibus fulvis. Laminis abdominalibus haud integris, marginem posteriorem primi segmenti attingentibus.» — Longueur : 2 millimètres.

Loja.

En ovale très court, subarrondi, moyennement convexe, luisant en dessus, entièrement fauve en dessus et en dessous, avec le milieu du méso et du métasternum légèrement brunâtre; pubescence fine et couchée, grisâtre en dessus, un peu plus dense et jaunâtre en dessous. Palpes et antennes roux; mandibules noires. Pieds fauves. Plaques abdominales en arc de cercle atteignant le bord postérieur du premier segment abdominal vers le tiers interne et confondues avec lui. Prosternum sans carène.

Cette espèce appartient au *G. Diomus*; elle se distingue très facilement des autres espèces sud-américaines à élytres flaves : du *D. pallidipennis* Muls. et du *D. tucumanus* Weise par ses élytres sans bordures ou dessins noirs; du *D. tantillus* Muls., par sa taille plus grande et ses élytres à extrémité concolore. Son aspect extérieur et sa forme générale rappellent le *Pullus* ab. *Juniperi* Mots.